

# **GARGABEM<sup>®</sup>**

**cloridrato de benzidamina**

**1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

**PASTILHA**

**3,0 MG/PASTILHA**

**BULA PACIENTE****I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Gargabem<sup>®</sup>  
cloridrato de benzidamina 3,0 mg/pastilha

**APRESENTAÇÕES**

Pastilhas nos sabores menta-limão *diet*, laranja, mel – limão, menta – limão e cereja: embalagens com 12 pastilhas.

**USO ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS****COMPOSIÇÃO**

Cada pastilha sabor menta – limão *diet* contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de menta – limão, amarelo de tartrazina, azul indigotina, isomalte, acessulfamo, talco.

Cada pastilha sabor laranja contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de laranja, amarelo crepúsculo, talco, sacarose, glicose.

Cada pastilha sabor mel – limão contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de mel, aroma de lima – limão, amarelo de tartrazina, talco, sacarose, glicose.

Cada pastilha sabor menta – limão contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de menta – limão, amarelo de tartrazina, azul indigotina, talco, sacarose, glicose.

Cada pastilha sabor cereja contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de cereja, vermelho amaranço, talco, sacarose, glicose.

**II. INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Gargabem<sup>®</sup> é destinado ao tratamento de processos inflamatórios e dolorosos da boca e garganta porque apresenta propriedades anti-inflamatória, analgésica e anestésica.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O efeito tripla ação do Gargabem<sup>®</sup> (atuação como anti-inflamatório, analgésico e anestésico bucal) ocorre porque a benzidamina tem o efeito direto nas células onde existe o processo inflamatório. Ele age onde é necessário nos tecidos inflamados, e seus efeitos se manifestam somente nas áreas alteradas, ajudando a curar o local inflamado. A atividade

## BULA PACIENTE

anestésica do cloridrato de benzidamina se inicia nos primeiros 5 minutos após a sua utilização

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gargabem<sup>®</sup> não deve ser utilizado por pacientes que tenham alergia ao cloridrato de benzidamina ou aos demais componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.**

Para Gargabem<sup>®</sup> pastilha nos sabores laranja, mel – limão, menta – limão e cereja:

**Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.**

Para Gargabem<sup>®</sup> pastilha nos sabores menta – limão *diet*, menta – limão e mel – limão:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de insuficiência renal consulte seu médico antes de utilizar Gargabem<sup>®</sup>.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Para Gargabem<sup>®</sup> pastilha nos sabores laranja, mel – limão, menta – limão e cereja:

**Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.**

Para Gargabem<sup>®</sup> pastilha nos sabores menta – limão *diet*, menta – limão e mel – limão:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Gargabem<sup>®</sup> pastilha deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto:

Gargabem<sup>®</sup> pastilha sabor menta – limão *diet*: pastilha circular, face plana de cor verde, sabor e odor característicos de menta – limão.

Gargabem<sup>®</sup> pastilha sabor laranja: pastilha circular de cor laranja, face plana, sabor e odor característicos de laranja.

Gargabem<sup>®</sup> pastilha sabor mel – limão: pastilha circular, face plana de cor amarela, sabor e odor característicos de mel – limão.

Gargabem<sup>®</sup> pastilha sabor menta – limão: pastilha circular, face plana de cor verde, sabor e odor característicos de menta – limão.

Gargabem<sup>®</sup> pastilha sabor cereja: pastilha circular, face plana de cor vermelha, sabor e odor característicos de cereja.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia até o alívio dos sintomas.

**BULA PACIENTE**

Limite máximo diário de 10 pastilhas.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Retomar o tratamento até o alívio dos sintomas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade, incluindo urticária, fotossensibilidade, e broncoespasmo muito raramente.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Em caso de ingestão acidental de doses elevadas, poderão ocorrer agitação, ansiedade, alucinações e convulsões.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**III- DIZERES LEGAIS**

Reg. MS.: 1.0481.0138

Farm. Resp.: Lourival Lucas dos Reis Campos

CRF-MG: 28.156

Fabricado por: **ATLANTE BALAS E CAMELOS LTDA.**

Piracicaba - SP

Embalado por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**

Pouso Alegre - MG

Registrado por: **1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Avenida Angélica, 2.248, 6º andar, conjunto 62, Consolação - São Paulo - SP

CEP: 01228-200 - CNPJ: 48.113.906/0001-49

Indústria Brasileira - ®Marca Registrada

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

0800 704 46 47 [www.cimedremedios.com.br](http://www.cimedremedios.com.br)

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



## Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
06/06/2018	0453131/18-1	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	06/06/2018	0453131/18-1	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	06/06/2018	. Para quê este medicamento é indicado? . Como este medicamento funciona? . Quando não devo usar este medicamento? . O que devo saber antes de usar este medicamento? . Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? . Como devo usar este medicamento? . O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? . Quais os males que este	VP/VPS	Todas apresentações

BULA PACIENTE



							medicamento pode me causar? . o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? . Indicações . Resultados de eficácia . Características farmacológicas . Contra – indicações . Advertências e precauções . Interações medicamentosas . Cuidados de armazenamento do medicamento . Posologia e modo de usar . Reações adversas . Superdose		
31/07/2019	1913663/19-3	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/07/2019	1913663/19-3	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/07/2019	. Dizeres Legais	VP/VPS	Todas apresentações
11/11/2020	3963787/20-5	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no	11/11/2020	3963787/20-5	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula –	11/11/2020	. Reações adversas	VPS	Todas as apresentações

BULA PACIENTE



		bulário– RDC 60/12			publicação no bulário– RDC 60/12				
11/02/2023	--	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no bulário– RDC 60/12	11/02/2023	--	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no bulário– RDC 60/12	11/02/2023	Harmonização da bula com o medicamento de referência Flogoral, atualização do item: Dizeres Legais, devido a reativação de fabricação do medicamento Gargabem® protocolada em 27/01/2023 sob expediente n° 0086360/23-0	VP/VPS	Todas as apresentações

# **GARGABEM<sup>®</sup>**

**cloridrato de benzidamina**

**1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

**COLUTÓRIO *SPRAY***

**1,5 MG/ML**

## MODELO BULA PACIENTE

### I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Gargabem<sup>®</sup>  
cloridrato de benzidamina 1,5 mg/mL

### APRESENTAÇÕES

Colutório *spray* 1,5 mg/mL nos sabores menta e mel: frasco com 30 mL.

**USO BUCAL – Não ingerir**  
**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS**

### COMPOSIÇÃO

Cada mL de colutório *spray* sabor mel contém:

cloridrato de benzidamina..... 1,5 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 mL

\*equivalente a 1,34 mg de benzidamina

\*\*álcool etílico, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sorbitol, amarelo crepúsculo, azul brilhante, água purificada e aroma de mel.

Cada mL de colutório *spray* sabor menta contém:

cloridrato de benzidamina..... 1,5 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 mL

\*equivalente a 1,34 mg de benzidamina

\*\*álcool etílico, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sorbitol, amarelo de tarrazina, azul indigotina, mentol cristal, água purificada e óleo de ricino hidrogenado etoxilado.

### II. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Gargabem<sup>®</sup> é destinado ao tratamento de processos inflamatórios e dolorosos da boca e garganta porque apresenta propriedades anti-inflamatória, antiséptica, analgésica e anestésica. Gargabem<sup>®</sup> pode ser usado no tratamento de aftas e outras manifestações inflamatórias da boca e da língua; na dor de dente e da gengiva (estomatites); na dor e inflamação da garganta (sintomas locais do resfriado comum e da gripe); e na dor após procedimentos e cirurgias dentárias, da boca ou garganta (retirada das amígdalas e adenoide, extração dentária entre outras).

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Gargabem<sup>®</sup> possui em sua composição a benzidamina, uma substância que apresenta diversos efeitos:

- efeito anti-inflamatório (reduz o processo de inflamação, ou seja, reduz a vermelhidão, o inchaço, a dor e o aumento da temperatura do local acometido);
- efeito analgésico e anestésico (reduz a dor, dando sensação de anestesia local);
- efeito antiséptico (controla o crescimento de alguns microrganismos patológicos).

A benzidamina tem efeito direto nas células que apresentam processo inflamatório. A benzidamina age onde é necessário, nos tecidos inflamados, e seus efeitos se manifestam somente nas áreas alteradas e não nos tecidos normais, ajudando a curar o local inflamado. A atividade anestésica do cloridrato de benzidamina se inicia nos primeiros 5 minutos após a sua utilização.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gargabem<sup>®</sup> não deve ser utilizado por pacientes que tenham alergia ao cloridrato de benzidamina ou aos demais componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.**

## MODELO BULA PACIENTE

Gargabem<sup>®</sup> colutório *spray* no sabor menta:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de insuficiência renal (alteração da função dos rins), consulte seu médico antes de utilizar Gargabem<sup>®</sup>.

#### **GARGABEM<sup>®</sup> NÃO DEVE SER INGERIDO.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Gargabem<sup>®</sup> não contém açúcar.

Gargabem<sup>®</sup> colutório *spray* no sabor menta:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Gargabem<sup>®</sup> Colutório *spray* deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto:

Colutório *spray* sabor menta: Solução verde esmeralda, límpida, com odor característico.

Colutório *spray* sabor mel: Solução alaranjada, límpida, com odor característico de mel.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Fazer 2 a 6 nebulizações ao dia nas áreas inflamadas da boca e/ou garganta até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário de 10 nebulizações.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Retomar o tratamento até o alívio dos sintomas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Logo após a administração de Gargabem<sup>®</sup> colutório *spray* pode ocorrer sensação de dormência no local de aplicação com perda da sensibilidade local, em razão de seu efeito anestésico. Podem ocorrer reações de hipersensibilidade,

**MODELO BULA PACIENTE**

incluindo urticária, fotossensibilidade, e broncoespasmo, muito raramente.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

A concentração de benzidamina em Gargabem<sup>®</sup> colutório *spray* é muito baixa, o que torna improvável a intoxicação por ingestão acidental. Casos de intoxicação por benzidamina são descritos com ingestão por volta de 500 mg da substância. Um frasco de Gargabem<sup>®</sup> (30 mL) contém 45 mg de benzidamina no total.

Em caso de ingestão acidental de doses elevadas, poderão ocorrer agitação, ansiedade, alucinações e convulsões. Procure um médico ou serviço de saúde imediatamente em caso de ingestão acidental de grandes quantidades de Gargabem<sup>®</sup> para que medidas de suporte possam ser instituídas o mais breve possível.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III- DIZERES LEGAIS**

Reg. MS.: 1.0481.0138

Farm. Resp.: Lourival Lucas dos Reis Campos

CRF-MG: 28.156

Fabricado por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**

Pouso Alegre - MG

Registrado por: **1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Avenida Angélica, 2.248, 6º andar, conjunto 62, Consolação - São Paulo - SP

CEP: 01228-200 - CNPJ: 48.113.906/0001-49

Indústria Brasileira - <sup>®</sup>Marca Registrada

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

0800 704 46 47 [www.cimedremedios.com.br](http://www.cimedremedios.com.br)

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**





**Histórico de alteração para a bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
06/06/2018	0453131/18-1	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	06/06/2018	0453131/18-1	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	06/06/2018	. Para quê este medicamento é indicado? . Como este medicamento funciona? . Quando não devo usar este medicamento? . O que devo saber antes de usar este medicamento? . Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? . Como devo usar este medicamento? . O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? . Quais os males	VP/VPS	. 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MENTA  . 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MEL

MODELO BULA DO PACIENTE



							<p>que este medicamento pode me causar?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?</li><li>. Indicações</li><li>. Resultados de eficácia</li></ul> <p>Características farmacológicas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Contra – indicações</li><li>. Advertências e precauções</li><li>. Interações medicamentosas</li><li>. Cuidados de armazenamento do medicamento</li><li>. Posologia e modo de usar</li><li>. Reações adversas</li><li>. Superdose</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

MODELO BULA DO PACIENTE



31/07/2019	1913663/19-3	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/07/2019	1913663/19-3	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/07/2019	. Dizeres Legais	VP/VPS	. 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MENTA  . 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MEL
11/11/2020	3963787/20-5	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no bulário– RDC 60/12	11/11/2020	3963787/20-5	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no bulário– RDC 60/12	3963787/20-5	. Reações adversas	VPS	. 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MENTA  . 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MEL
11/02/2023	--	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no bulário– RDC 60/12	11/02/2023	--	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no bulário– RDC 60/12	11/02/2023	Harmonização da bula com o medicamento de referência Flogoral, atualização do item: Dizeres Legais, devido a reativação de fabricação do medicamento Gargabem® protocolada em	VP/VPS	1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MENTA  1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MEL

**MODELO BULA DO PACIENTE**



							27/01/2023 sob expediente n° 0086360/23-0		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--