



STARFOR C

aspartato de arginina + ácido ascórbico

APRESENTAÇÃO

Linha Farma: Cartucho contendo tubo plástico com 10 e com 16 comprimidos efervescentes.

FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido efervescente.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido efervescente contém:

aspartato de arginina (equivalente a 567 mg de arginina base).....1 g
ácido ascórbico (vitamina C)1 g
Excipientes q.s.p.....1 comprimido efervescente
(ácido cítrico, bicarbonato de sódio, aspartame pó, corante amarelo tartrazina, aroma laranja, benzoato de sódio).

| Componentes ativos do medicamento STARFOR C | Dose 1 comprimido efervescente/dia | % IDR (RDC n.º 269/05) |
|---|------------------------------------|------------------------|
| Aspartato de arginina | 1 g | - |
| Ácido ascórbico (vitamina C) | 1 g | 2222,22% |

% IDR = Porcentagem em relação à Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

STARFOR C atua como antioxidante, auxiliar do sistema imunológico. Auxiliar na recuperação durante o período pós-cirúrgico.



Indicado na suplementação em casos de carência de vitamina C.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Assim como o ácido ascórbico, vitamina C, a arginina também atua no sistema imunológico, melhorando a resposta das células de defesa. A combinação destas ações com as propriedades antioxidantes que possui em comum com o ácido ascórbico auxiliam na recuperação de traumas como, por exemplo, cirurgias.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto não deve ser utilizado por pessoas que apresentam alergia à vitamina C e/ou ao aspartato de L arginina, componentes do STARFOR C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

ESTE PRODUTO CONTÉM O CORANTE AMARELO DE TARTRAZINA QUE PODE CAUSAR REAÇÕES DE NATUREZA ALÉRGICA, ENTRE AS QUAIS ASMA BRÔNQUICA, ESPECIALMENTE EM PESSOAS ALÉRGICAS AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Em casos de alergia aos componentes da fórmula, orienta-se interromper o uso da medicação e procurar orientação médica. STARFOR C deve ser usado com cuidado por pessoas com litíase oxálica e úrica (pedra nos rins) e, preferencialmente, sob orientação médica.

A arginina não é recomendada para pacientes que sofreram ataque cardíaco.

Pessoas que fazem o uso dos medicamentos citados no item INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS devem ter cuidado na administração de medicamentos que contenham vitamina C em sua formulação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso concomitante da vitamina C com barbitúricos, tetraciclina e salicilatos podem aumentar sua excreção pela urina. Foi observado, ainda, que a vitamina C aumenta os níveis sanguíneos de



etinilestradiol. A administração de anticoncepcionais orais reduziu os níveis de vitamina C no plasma sanguíneo e nos leucócitos em mulheres saudáveis. Quanto ao aspartato de arginina, até o momento não são conhecidas as possíveis interações com outros medicamentos.

Este medicamento é contraindicado para crianças.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o produto em sua embalagem original, à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

O medicamento STARFOR C é apresentado na forma comprimido efervescente de cor laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Starfor C 10 comprimidos efervescentes: Após aberto, válido por 10 dias.

Starfor C 16 comprimidos efervescentes: Após aberto, válido por 16 dias.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 1 comprimido efervescente uma vez ao dia. (dose diária de 1 g de aspartato de arginina e 1 g de ácido ascórbico).

Não ultrapassar a dose recomendada (1 comprimido efervescente ao dia).

Dissolver o comprimido efervescente em um copo com água e beber imediatamente após o término da diluição, de preferência durante as refeições.



Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião- dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso esqueça-se de administrar uma dose, administre-a assim que possível, no entanto se estiver próximo ao horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia.

Nunca ultrapasse a posologia diária recomendada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião- dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Raramente ocorrem efeitos indesejados. Nestes casos, acabam sendo de pequena intensidade. Como reações adversas foram observadas a ocorrência de diarreia, náusea e vômito.

Há relatos de que a ingestão de vitamina C aumenta os níveis de oxalato e ácido úrico. No entanto, este aumento não foi associado com a ocorrência de pedras nos rins.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Raramente, doses maiores do que 3 g de vitamina C (equivalente ao conteúdo de 03 comprimidos de STARFOR C – Comprimido Efervescente) podem causar leves efeitos gastrintestinais. Neste caso, deve-se interromper o uso e procurar orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Natulab

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

DIZERES LEGAIS

MS: 1.3841. 0041

Farm. Responsável: Tales de Vasconcelos Cortes - CRF/BA nº 3745

NATULAB LABORATÓRIO SA

Rua H, nº2, Galpão 03 - Urbis II

Santo Antonio de Jesus - Bahia – CEP 44.574-150

CNPJ 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: 0800 730 7370

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



Anexo B Histórico de Alteração da Bula

| Dados da submissão eletrônica | | | Dados da petição/notificação que altera bula | | | | Dados das alterações de bulas | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|------------------|--|-------------------|---|----------------------------|--|
| Data do expediente | No. expediente | Assunto | Data do expediente | Nº do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula ²¹ | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas |
| 17/06/2014 | - | 10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12 | 17/06/2014 | - | 10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12 | 17/06/2014 | 1º submissão no bulário eletrônico. | Bulas para o Paciente (VP) | aspartato de arginina 1 g + ácido ascórbico 1 g Comprimido Efervescente |
| 16/09/2014 | 0769282/14-0 | 10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12 | 16/09/2014 | 0769282/14-0 | 10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12 | 16/09/2014 | 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO ? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES-INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS. 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO ? | Bulas para o Paciente (VP) | aspartato de arginina 1 g + ácido ascórbico 1 g Comprimido Efervescente |
| 12/02/2016 | 1261083/16-6 | 10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 12/02/2016 | 1261083/16-6 | 10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 12/02/2016 | Apresentação | Bulas para o Paciente (VP) | aspartato de arginina 1 g + ácido ascórbico 1 g Comprimido Efervescente |
| 09/10/2019 | - | 10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 09/10/2019 | - | 10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 09/10/2019 | Texto do ITEM 5-frase de validade pós-abertura | Bulas para o Paciente (VP) | aspartato de arginina 1 g + ácido ascórbico 1 g Comprimido Efervescente |